



Concimi speciali

ценность опыта
сила инноваций

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

БИОЛКИМ МЭ БОРОМИН ГЕЛЬ

BOROMIN GEL

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ
БОРНОЕ УДОБРЕНИЕ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
УРОЖАЯ ХОРОШЕГО
КАЧЕСТВА**



**ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЕЙ
БОРА, УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИ-
ЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ**

**ЭФФЕКТИВНОЕ ПОГЛО-
ЩЕНИЕ БОРА И ВЫСОКАЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДАЖЕ
ПРИ НИЗКИХ ДОЗАХ**

www.biolchim.it

Этот продукт содержит Бор в комплексе с бор-этаноломином, что обеспечивает полное поглощение бора и увеличивает подвижность элемента внутри тканей растений, повышая эффективность от применения препарата. Boromin Gel подходит для применения под чувствительные культуры.

- ✓ Увеличивает содержание сахара в плоде.
- ✓ Увеличивает количество, жизнеспособность и всхожесть пыльцы.
- ✓ Увеличивает завязывание плодов и формирование семян.

СОСТАВ

	w/w	w/v	г/л
Бор водорастворимый.....	11%	15%	150

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Форма	Плотность, кг/л
BOROMIN GEL	Жидкий	1.360

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Культура	Время внесения, некорневая подкормка	Дозы, л/га
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Перед цветением, до завязывания плодов	1–1,5 л/га
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Перед цветением	100–150 мл/100л
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ	Перед цветением, после завязывания плодов	1–1,5 л/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА	От появления первых 7–8 настоящих листьев и перед смыканием листьев в рядах	2 л/га

BIOLCHIM SpA

Via San Carlo, 2130 – 40059 Медичина (BO) – Италия
Тел. +39 051 6971811 – Факс +39 051 852884
www.biolchim.it – biolchim@biolchim.it

УПАКОВКА: 1–5–20 л

