



**Biolchim**

Concimi speciali

ценность опыта  
сила инноваций

БИОСТИМУЛЯТОРЫ

# БИОЛКИМ СПРИНТАЛГА SPRINTALGA

## БИОСТИМУЛЯТОР РАЗВИТИЯ КОРНЕЙ

- СТИМУЛИРУЕТ ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
- УЛУЧШАЕТ ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН
- СПОСОБСТВУЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛОДА



**win** | worldwide  
innovation network

**EBIC**  
European Biostimulants Industry Consortium



Concimi speciali

УПАКОВКА: 1–5 л



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря своей эксклюзивной формулировке на основе аминокислот растительного происхождения, пептидов низкого молекулярного веса и концентрированной водорослевой суспензии *Macrocyctis, Ascophillum u Sargassum*, **Sprintalga** может оказывать тройной эффект в зависимости от времени воздействия:

1. Стимулировать образование и развитие корневой системы;
2. Улучшать качественные характеристики урожая.
3. Улучшать прорастание семян.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- Стимулирует растение увеличивать массу корней и улучшать их поглощающую способность.
- Ускоряет рост, развитие органов цветка и формирование плода (концентрированная водорослевая суспензия и аминокислотный состав).
- Увеличивает размер и средний вес плодов.
- Ускоряет цветение в цветущих культурах.
- Увеличивает урожайность.

## СОСТАВ

	w/w	w/v	г/л
Общий азот (N) .....	12%	14.4%	144
Органический азот (N) .....	3,4%	4,08%	40,8
Азот мочевины(N) .....	8,6%	10,32%	103,2
Органическое вещество, % .....	11,9%	14.28%	142.8
Водорослевая суспензия: 60%			

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

### ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОРНЕЙ

*Продукт может быть применен:*

- Перед пересадкой, во время полива питомников раствором 30–50 мл/100л.
- Во время высадки или через 24 часа после нее капельным поливом в дозах 1.5–2.5 л/га. Внесение должно быть повторено 7–10 дней спустя.

### ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЛОДОВ

- **Фруктовые деревья:** методом внекорневой подкормки, во время набухания плодов совместно с **Ligoplex Ca**, в дозах ..... 300–500 мл/га
- **Столовый виноград:** когда побеги длиной 15 см, методом внекорневой подкормки в дозах ..... 300–500 мл/га  
Во время набухания плодов, методом внекорневой подкормки, смешать с **Ligoplex Ca** в дозах ..... 300–500 мл/га
- **Виноград:** методом внекорневой подкормки, когда побеги длиной 15–20 см и перед цветением, в дозах. .... 150–200 мл/га
- **Овощи:** методом внекорневой подкормки в дозах ..... 25 мл/100 л воды, во время созревания плодов
- **Цветочные и декоративные культуры:** методом внекорневой подкормки в дозах ..... 30–50 мл/100 л воды

### ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН

- **Зерновые, соя:** протравливание семян в дозах ..... 0.25–0.5 л/т

## СОВМЕСТИМОСТЬ

**Sprintalga** может быть смешана со всеми распространенными составами, однако рекомендуется провести простой тест на смешивание для проверки совместимости.

## BIOLCHIM SpA

Via San Carlo, 2130 – 40059 Medicina (BO) Italy  
ph. +39 051 6971811 – fax +39 051 852884  
www.biolchim.it – biolchim@biolchim.it